Alvogyl

Pâte alvéolaire antiseptique et analgésique

DIN 00555509

Formule

Iodoforme	15,8 g
Butamben (Paraminobenzoate de butyle)	25,7 g
Eugénol	13 7 g
Penghawar	3,5 g
Excipient q.s.p.	100,00 g

Propriétés

L'iodoforme, antiseptique puissant, est associé dans cette formule au butoforme, anesthésique de longue durée, sur un support à base de penghawar.
L'action antiseptique et analgésique de l'ALVOGYL sur les tissus alvéolaires, permet de soulager les symptômes douloureux post-extractionem et de contrôler l'infection.
Introduit dans l'alvéole infectée, ALVOGYL calme rapidement les douleurs résultant de l'extraction. Il exerce son activité pendant plusieurs heures, après lesquelles il s'élimine sans recours du praticien.
ALVOGYL contribue à une cicatrisation indolore dans un minimum de temps.

Indications

Soins alvéolaires après extraction.

Mode d'emploi

A l'aide d'une précelle stérilisée, prélever une quantité suffisante d'ALVOGYL pour couvrir les tissus lacérés, puis placer dans l'alvéole.
L'excès de produit s'élimine de lui-même.

Contre-indications

- Malades ayant des antécédents de réactions allergiques aux anesthésiques du type procaïne.
- Hypersensibilité à l'iode ou aux dérivés iodés.
- Ne pas suturer la plaie.

Présentation

Pot de 12 g.

Distribué par :
NOVOCOL PHARMACEUTICAL OF CANADA INC.
CAMBRIDGE
ONTARIO N1R 5S9

SPÉCIALITÉS SEPTODONT- 58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex, France.
Tél.: 01 49 76 70 00

07/97 ® 05 08 047 06 00

Alvogyl

Antiseptic and analgesic alveolar paste

DIN 00555509

Formula

Iodoform	15.8 g
Butamben (Butyl paraminobenzoate)	25.7 g
Eugenol	13.7 g
Penghawar	3.5 g
Excipient q.s.p.	100.0 g

Properties

Iodoform, a potent antiseptic is associated in this formulation with butoform, an anaesthetic of long duration, in an excipient containing penghawar.
The antiseptic and analgesic action of ALVOGYL on the alveolar tissues provides alleviation of post-extraction trauma and control of infection.
Introduced into an infected socket, ALVOGYL promptly alleviates post-extraction pain. Its action is effective for several hours, after which it eliminates itself without assistance from the practitioner.
ALVOGYL contributes to painless healing in a minimum of time.

Indications

Post-extraction care.

Directions for use

With a pair of sterelized tweezers, remove a sufficient quantity of ALVOGYL to adequately cover the lacerated tissues and pack gently in place. Any excess product will eliminate itself.

Contra-indications

- Patients with a known history of allergic reactions to procaine type anaesthetics.
- Hypersensitivity to iodine or iodinated compounds.
- Do not suture the wound.

Presentation

In 12 g jar.

Distributed by :
NOVOCOL PHARMACEUTICAL OF CANADA INC.
CAMBRIDGE
ONTARIO N1R 5S9

SPÉCIALITÉS SEPTODONT- 58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex, France.
Tél.: 01 49 76 70 00